

# Notarzt-Kurs Freiburg

## Szenario Trauma 1: Sturz > 3m mit WS Trauma

NEF 2 Personen, RTW 2 Personen, 1 Patient, ggf. 1 Arbeitskollege als Einweiser

**Fallbeschreibung:** Fensterputzer stürzt ca. 2,5m mit Rücken (LWS) auf Boardsteinkante, Patient hat versucht den Sturz mit der rechten Hand abzufangen, der Einsatzort befindet sich in einem Industriegebiet außerhalb des Stadtgebiets.

**Lernziele / Debriefing:** Erkennen und Behandeln des generalisierten Trauma mit Fokus auf das WS Management und erkennen C-Problem durch einen spinalen Schock.

Name, 38 Jahre 182cm, 75kg	Arbeiter	Komplexität: /**/	Briefing: 2 min Fall: 13 min	Debriefing: 15 min Gesamt: 30 min
<b>Fallvignette für die Teilnehmer:</b>				
Einsatzmeldung: Arbeitsunfall: Fensterputzer Zn Sturz aus ca. 3m, Patient ist wach und ansprechbar				
Anfahrtszeit: 15 min				
Transportzeit: 25 min. Regelversorger, 25 min. Maximalversorger mit 25; <b>FLUGWETTER</b>				
<b>Situation bei Eintreffen:</b>				
Einweisung durch Arbeitskollegen, Pat. liegt auf Gehweg auf der Seite und klagt über starke Schmerzen am UA, dort ist eine Stufe am distalen UA zu sehen, außerdem kann er seine Beine nicht mehr bewegen.				
<b>Erstbefund:</b>		<b>Befunde:</b>		
A	Frei			
B	Tachypnoe, Af 20/min, SpO <sub>2</sub> 94%			
C	Puls peripher schwach tastbar, Puls schach tastbar bei 90/min, RR 90mmHg/50mmHg			
D	w+o, Sensibilitätsstörung beide Beine, kann die Beine nicht bewegen, kein Hinweis auf SHT			
E	Temperatur 36.4°C			
	STU  Polytrauma: Kopf, Thorax und Abdomen unauffällig, Becken stabil, Grober Bodycheck: UA#, Beine äußerlich intakt	S: s.o. A: Nüsse, Amoxicillin M: bei Bedarf Ibu bei LWS Schmerzen P: unauffällig L: vor ½ Std. Vesperpause E: Beim Fensterputzen abgerutscht und gestürzt R: Raucher S: keine		
<b>Ablauf: Priorisiertes Vorgehen nach ABCDE unter Beachtung eines adäquaten WS Management.</b>				
A	bleibt frei, nie gefährdet			
B	AF 20/min			
C	HF 90/min, RR 65/--mmHg			
D	GCS 12, Patient trübt aufgrund C Problem ein			
E				
	Verlauf:  Ganzkörper Immobilisation			
	C-Problem kann mit Katecholaminperfusor (Arterenol) behandelt werden	Besonderes Material / Requisiten: „Fensterabzieher“, Wassereimer		
	Schonender Transport in Abwägung Heli oder bodengebundener Transport			
		<b>Med. Infos</b> <b>C-Problem benötigt u.a. Vasopressoren zur Kreislaufstabilisierung</b>		

Ersteller: S. Gutmann